

ابق على اطلاع بشأن الحصبة في ألبرتا

14 مارس 2025 استفسارات وسائل الإعلام

تطلب حكومة ألبرتا من سكان ألبرتا أن يكونوا على دراية بأعراض الحصبة وأن يستخدموا الموارد المتاحة لحماية أنفسهم ومنع انتشارها بشكل أكبر.

تزايد حالات الإصابة بالحصبة على مستوى العالم، حيث أبلغت العديد من البلدان ووجهات السفر عن تفشي المرض. وقد تم تحديد حالات إصابة في العديد من المقاطعات الكندية، بما في ذلك تفشي المرض الذي تم تحديده مؤخراً في شمال ألبرتا.

اعتباراً من 13 مارس، أكد مسؤولو الصحة وجود ست حالات إصابة بالحصبة في المقاطعة، وعلى الرغم من أن هذه الحالات كلها تنتهي إلى أسرة واحدة، إلا أن هذا يثير المخاوف بشأن احتمال انتشار هذا المرض شديد العدوى.

الحصبة مرض شديد العدوى وينتشر بسهولة عبر الهواء. الأشخاص الذين ولدوا في عام 1970 أو منذ عام 1970 والذين تلقوا أقل من جرعتين من اللقاح المحتوي على الحصبة معرضون للإصابة بالعدوى. إن الأشخاص الذين تلقوا أقل من جرعتين من اللقاح المحتوي على الحصبة والحوامل، أو الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، أو البالغين وأو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الحصبة.

”الحصبة ليست مجرد مرض خفيف يصيب الأطفال - بل هي مرض خطير وشديد العدوى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. لحسن الحظ، لدينا لقاح فعال للغاية مع سجل حافل من السلامة ثبت فعاليته منذ فترة طويلة. يجب أن يخصص كل شخص الوقت الكافي للتحقق من سجل التطعيمات الخاص به للتأكد من حصوله على التطعيم الكامل. لا ينبغي لأحد أن يتحمل عواقب مرض يمكننا الوقاية منه.“

د. مارك جوف، كبير المسؤولين الطبيين في الصحة

للاحصبة فعال للغاية في الوقاية من العدوى والمضاعفات. في ألبرتا، يتم تقديم لقاح الحصبة مجاناً لسكان ألبرتا المؤهلين من خلال برنامج التحصين الممول من القطاع العام في ألبرتا.

في حال ظهور أعراض الحصبة، يُنصح الأفراد بالبقاء في المنزل والاتصال ب Health Link على الرقم 811 قبل زيارة أي مرافق رعاية صحية أو مقدم رعاية صحية، بما في ذلك عيادة طبيب الأسرة أو الصيدلية.

تشمل أعراض الحصبة ما يلي:

- حمى 38.3 درجة مئوية أو أكثر
- السعال و/أو سيلان الأنف و/أو احمرار العينين
- طفح جلدي أحمر مبقع يظهر بعد ثلاثة إلى سبعة أيام من بدء الحمى، عادةً ما يبدأ خلف الأذنين وعلى الوجه وينتشر في الجسم ثم في الذراعين والساقيين

يمكن لسكان ألبرتا الذين ليسوا متأكدين من تاريخ تحصينهم أو تاريخ تحصين أطفالهم إرسال رسالة نصية "سجل اللقاح" إلى 88111 أو الاتصال ب Health Link على الرقم 811 أو **مكتب الصحة العامة المحلي**. يمكن لسكان ألبرتا أيضًا إرسال كلمة "الحصبة" إلى 88111 للحصول على معلومات صحية عن الحصبة عبر الرسائل النصية إلى أجهزتهم المحمولة. يرجى الاتصال بمقدم الرعاية الأولية للحصول على المشورة بشأن التطعيمات الأفضل لك.

لمزيد من المعلومات حول التطعيم الروتيني للأطفال، يرجى زيارة ahs.ca/immunize.

لمزيد من المعلومات عن مرض الحصبة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ahs.ca/measles.

حقائق سريعة

- يمكن أن تكون الحصبة خطيرة بسبب:
- يصاب واحد من كل 10 أشخاص مصابين بالحصبة بالتهابات الأذن الوسطى أو الرئة.
- يصاب شخص واحد من كل 1000 شخص مصاب بالحصبة بالتهاب الدماغ (تورم الدماغ)، والذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات صرع أو صمم أو تلف في الدماغ.
- يموت واحد إلى ثلاثة من كل 1000 شخص مصاب بالحصبة.
- يصاب أكثر من 90 في المائة من الأشخاص غير المحسنين ضد الحصبة والذين يخالطون الفيروس بالعدوى.
- عادةً ما يتلقى الأطفال في ألبرتا الجرعة الأولى من اللقاح المحتوي على الحصبة في عمر 12 شهراً، والجرعة الثانية في عمر 18 شهراً. يعتبر الأطفال الذين تلقوا جرعتين من اللقاح محميين.
- يجب أن يكون لدى البالغين المولودين في عام 1970 أو بعد ذلك تاريخ موثق لجرعتين من اللقاح المحتوي على الحصبة على مدى الحياة يفصل بينهما أربعة أسابيع على الأقل إذا لم يكن لديهم تاريخ مرضي مؤكّد مخبرياً أو دليلاً مفصلياً على المناعة ضد الحصبة.
- يعتبر البالغون الذين ولدوا قبل عام 1970 محسنين ضد الحصبة، حيث كانت الحصبة منتشرة على نطاق واسع قبل عام 1970. قد يوصى بتناول جرعة أو جرعتين من اللقاح إذا كنت عاملاً في مجال الرعاية الصحية أو طالباً في مؤسسة تعليمية ما بعد الثانوية أو كنت مسافراً خارج كندا.

روابط ذات صلة

- التحصين واللقاحات
- تعرف أكثر على مرض الحصبة

استفسارات وسائل الإعلام

أندرو ليفينجستون

587-545-7075

مدير الاتصالات، الصحة