

了解有关阿尔伯塔省麻疹的最新信息

2025 年 3 月 14 日 [媒体咨询](#)

阿尔伯塔省政府要求居民了解麻疹症状并获取资源保护自己，防止麻疹进一步蔓延。

全球麻疹病例正在增加，许多国家和旅游目的地报告出现疫情。加拿大多个省份都发现了病例，包括最近在阿尔伯塔省北部发现的疫情。

截至 3 月 13 日，卫生官员已确认本省有 6 例麻疹病例，虽然这些病例都来自同一家庭，但这确实使人们担心这种高度传染性疾病有可能进一步传播。

麻疹是一种传染性极强的疾病，很容易通过空气传播。1970 年或以后出生的人，如果接种过的含麻疹成分的疫苗少于两剂，容易受到感染。接种的含麻疹疫苗少于两剂且怀孕、未满一岁、成年人和/或免疫系统较弱的人患麻疹并发症的风险最大。

“麻疹不仅仅是一种轻微的儿童疾病，它是一种严重的、传染性极强的疾病，可能带来灾难性的后果。值得庆幸的是，我们拥有一种高效疫苗，并且其安全性已得到长期验证。每个人都应该花时间检查自己的免疫接种记录，以确保自己已经完全接种疫苗。这种疾病我们能够预防，任何人都不该承受其后果。”

首席卫生官员马克·乔夫博士

麻疹疫苗对预防感染和并发症非常有效。在阿尔伯塔省，通过阿尔伯塔省公共资助的免疫项目，符合条件的居民可免费接种麻疹疫苗。

如果确认出现麻疹症状，建议个人待在家中，并在前往任何医疗机构或医疗服务提供方（包括家庭医生诊所或药房）之前拨打健康热线 811。

麻疹的症状包括：

- 发烧 38.3° C 或更高

- 咳嗽、流鼻涕和/或眼睛发红
- 发烧后三至七天出现红色斑点状皮疹，通常从耳后和面部开始，然后蔓延至身体，最后到达手臂和腿部

如果阿尔伯塔省居民不确定自己或孩子的免疫接种史，可以编辑短信“vaccine record”发送至 88111，拨打健康热线 811 或联系[当地公共卫生办公室](#)。阿尔伯塔省居民还可以发送短信“measles”到 88111，麻疹健康信息将发送到他们的移动设备上。请联系您的初级保健提供者，获取最适合您的免疫接种建议。

有关常规儿童免疫接种的更多信息，请访问ahs.ca/immunize。

有关麻疹疾病的更多信息，请访问www.ahs.ca/measles。

速览

- 麻疹之所以危险是因为：
 - 每 10 名麻疹患者中就有 1 人会患上中耳感染或肺部感染。
 - 每 1,000 名麻疹患者中就有 1 人会患上脑炎（脑肿胀），这可能导致癫痫、耳聋或脑损伤。
 - 每1000名麻疹患者中，会有1至3人死亡。
- 超过 90% 对麻疹没有免疫力的人与该病毒接触后都会被感染。
- 阿尔伯塔省的儿童通常在 12 个月大时接种第一剂含麻疹的疫苗，并在 18 个月大时接种第二剂。接种两剂疫苗的儿童被认为受到保护。
- 对于 1970 年或以后出生的成年人，如果没有实验室确诊的疾病病史或没有麻疹免疫的血清证据，则应有记录证明一生中接种过两次含麻疹疫苗，两次接种间隔至少四周。
- 1970 年之前出生的成年人一般被认为对麻疹免疫，因为麻疹在 1970 年之前广泛传播。如果您是医护人员、高等教育机构的学生或正在加拿大境外旅行，可能会建议您接种一剂或两剂疫苗。

相关链接

- [免疫和疫苗](#)
- [了解麻疹](#)

媒体咨询

安德鲁·利文斯顿

587-545-7075

健康通讯负责人